

# Echinacin® Salbe Madaus

Salbe

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender Echinacin® Salbe Madaus

Salbe

Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut - Presssaft

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Echinacin® Salbe Madaus jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder innerhalb von 2 - 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Echinacin® Salbe Madaus und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Echinacin® Salbe Madaus beachten?
3. Wie ist Echinacin® Salbe Madaus anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Echinacin® Salbe Madaus aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST ECHINACIN® SALBE MADAUS UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Echinacin® Salbe Madaus ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Echinacin® Salbe Madaus wird traditionell angewendet zur Unterstützung der Wundheilung von kleinen, oberflächlichen Wunden. Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen, oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ECHINACIN® SALBE MADAUS BEACHTEN?

**Echinacin® Salbe Madaus darf nicht angewendet werden,** - wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Purpursonnenhutkraut, Korbblütlern oder einen der sonstigen Bestandteile wie z. B. Methyl-4-hydroxybenzoat, Propylenglycol, Wollwachs oder Butylhydroxytoluol sind.

#### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Echinacin® Salbe Madaus ist erforderlich.**

Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder innerhalb von 2-3 Tagen keine Besserung eintritt oder wenn Anzeichen einer Hautinfektion beobachtet werden (z.B. Rötung der Hautstelle), ist ein Arzt aufzusuchen.

#### **Kinder**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Anwendung von Echinacin® Salbe Madaus wird daher nicht empfohlen.

#### **Bei Einnahme von Echinacin® Salbe Madaus mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen sind im angegebenen Dosisbereich nicht untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Zur Anwendung des Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Anwendung von Echinacin® Salbe Madaus wird daher nicht empfohlen.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Echinacin® Salbe Madaus**

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

### 3. WIE IST ECHINACIN® SALBE MADAUS ANZUWENDEN?

Wenden Sie Echinacin® Salbe Madaus immer genau nach der Anwendung in dieser Packungsbeilage an.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Natur und Wissenschaft



MADAUS



# Echinacin® Salbe Madaus

Salbe

Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahre tragen 2-3 mal täglich einen Salbenstrang von 1-2 cm Länge dünn und gleichmäßig auf die Haut bzw. den Wundverband auf.

Für Kinder unter 12 Jahren ist die Anwendung nicht vorgesehen.

### Dauer der Anwendung

Echinacin® Salbe Madaus sollte im Rahmen der Selbstmedikation nicht länger als eine Woche angewendet werden. Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder innerhalb von 2-3 Tagen keine Besserung eintritt oder wenn Anzeichen einer Hautinfektion beobachtet werden (z.B. Rötung der Hautstelle), ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Echinacin® Salbe Madaus Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Selten wurden Überempfindlichkeitsreaktionen (lokale allergische Reaktionen) bei der Anwendung von Echinacin® Salbe Madaus beobachtet.

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist Echinacin® Salbe Madaus abzusetzen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### 5. WIE IST ECHINACIN® SALBE MADAUS AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach <verw. bis.> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel ist 3 Monate nach Anbruch haltbar.

### Aufbewahrungsbedingungen

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### Was Echinacin® Salbe Madaus enthält:

Der Wirkstoff ist: Purpursonnenhutkraut - Presssaft  
100 g Salbe enthalten 16 g Presssaft aus frischem blühenden Purpursonnenhutkraut [1,7 - 2,5 : 1]

Konservierungsmittel:  
Sorbinsäure

Die sonstigen Bestandteile sind:

gereinigtes Wasser, dickflüssiges Paraffin, gelbes Vaseline, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>40</sub>-C<sub>60</sub>), Ethanol 96 %, Propylenglycol, (Glycerol/sorbitan) (oleat/stearat),  $\alpha$ -Hydro- $\Omega$ -hydroxypoly[(oxy-1-decylethylen-co-(oxyethylen)-45], Wollwachsalkohole, Magnesiumsulfat-Heptahydrat

#### Wie Echinacin® Salbe Madaus aussieht und Inhalt der Packung

Originalpackungen mit 40 g elfenbeinfarbener Salbe

#### Pharmazeutischer Unternehmer

Rottapharm | Madaus GmbH, 51101 Köln  
Tel.: 0221/8998-0; Fax: 0221/8998-711  
Email: info@rottapharm-madaus.de

#### Zulassungsinhaber und Hersteller:

Madaus GmbH, 51101 Köln

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2011.**



MADAUS

Natur und Wissenschaft

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!



Mat.-Nr.: 701 460